



Effects of the Aqueous Extract of *Launaea acanthodes* Aerial Parts on Antioxidant and Renal Indices in Alloxan-Induced Diabetic Male Rats

Raheleh Rahbarian (Ph.D)^{*1} , Jalal Shegofte² 

¹ Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

² Ph.D Candidate in Molecular Genetics, Department of Biology, Faculty of Basic Science, Sistan and Bluchestan University, Zahedan, Iran.

Research Article

Abstract

Background and Objective: Diabetic nephropathy initiates with chronic hyperglycemia and the manifestation of significant alterations in renal indices. This stage represents a critical turning point between the onset of early diabetic nephropathy symptoms and renal damages. The present study aimed to evaluate the effects of the aqueous extract of *Launaea acanthodes* aerial parts on antioxidant and renal indices in alloxan-induced diabetic male rats.

Methods: In this experimental study, 32 adult male Wistar rats were randomly divided into four groups of eight animals each: A control group, a diabetic control group, and two treatment groups receiving the aqueous extract of *Launaea acanthodes* stems and leaves (100 and 300 mg/kg BW). Following a 16-hour fasting period, an experimental model of diabetes was induced in the diabetic control and treatment groups via a single intraperitoneal injection of alloxan monohydrate (120 mg/kg BW). Following the confirmation of experimental diabetes, the alloxan injection process was maintained every other day for 30 days. Thirty days after the induction of diabetes, the treatment process was performed intraperitoneally every other day using *Launaea acanthodes* extracts at concentrations of 100 and 300 mg/kg. Twelve hours after the completion of the 30th day, the animals were anesthetized, blood samples were collected via the left ventricle, and the kidney tissue was then excised. Blood plasma was separated from the blood samples, and blood urea nitrogen (BUN), urea, uric acid, and creatinine levels were measured. The Bradford assay was utilized to determine the total protein concentration. Glutathione S-transferase (GST) was assayed using a ZellBio kit, and catalase (CAT) activity was evaluated based on the decomposition of hydrogen peroxide. Additionally, superoxide dismutase (SOD) activity and malondialdehyde (MDA) levels were assessed.

Results: A significant increase in fasting blood glucose (FBG) and MDA levels, alongside a significant decrease in antioxidant enzymes, including SOD, GST, and CAT, was observed in the diabetic control group compared to the healthy control group ($P < 0.05$). Dose-dependent administration of the aqueous extract at concentrations of 100 and 300 mg/kg BW led to a significant reduction in FBG and MDA levels, as well as a significant increase in antioxidant enzymes, including SOD, GST, and CAT, compared to the diabetic control group ($P < 0.05$). Biochemical evaluations indicated a significant increase in blood urea, BUN, uric acid, and creatinine in the diabetic control group compared to the healthy control group ($P < 0.05$). Dose-dependent administration of the extract at concentrations of 100 and 300 mg/kg BW resulted in a significant decrease in blood urea, BUN, uric acid, and creatinine ($P < 0.05$).

Conclusion: It appears that the aqueous extract of *Launaea acanthodes* aerial parts dose-dependently attenuates hyperglycemia, oxidative stress, and renal indicators in alloxan-induced diabetic rats.

Keywords: Diabetes Mellitus; Oxidative Stress; Antioxidants; Kidney Function Tests; Diabetic Nephropathies

*Corresponding Author: Raheleh Rahbarian (Ph.D), E-mail: a_rahbarian@pnu.ac.ir



Received 17 Jun 2025 Received in revised form 2 Nov 2025 Accepted 3 Nov 2025 Available Online 15 Jul 2026

Cite this article as: Rahbarian R, Shegofte J. [Effects of the Aqueous Extract of *Launaea acanthodes* Aerial Parts on Antioxidant and Renal Indices in Alloxan-Induced Diabetic Male Rats]. J Gorgan Univ Med Sci. 2026; 28(1): 9-19. [Article in Persian]





Introduction

Diabetes mellitus induces lipid peroxidation (LPO) and increases malondialdehyde (MDA) levels through the generation of reactive oxygen species (ROS). Concurrently, endogenous antioxidant enzymes, such as superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione-S-transferase (GST), are attenuated. These alterations not only disrupt metabolism but also damage vital organs, particularly the kidneys, leading to diabetic nephropathy, as evidenced by elevations in biomarkers such as blood urea nitrogen (BUN), blood urea, creatinine, and uric acid. Plant extracts, such as nettle and rosemary, possess antioxidant and antidiabetic properties. *Launaea acanthodes* is a native plant utilized in the treatment of diabetes and inflammation.

The present study aimed to evaluate the effects of the aqueous extract of *Launaea acanthodes* aerial parts on antioxidant and renal indices in alloxan-induced diabetic male rats.

Methods

This experimental study was conducted on 32 adult male Wistar rats, aged 14-15 weeks and weighing 148 ± 16 g.

The *Launaea acanthodes* aerial parts (stems and leaves) were collected at the beginning of the flowering stage in the first half of May 2022 from an area of approximately 7 hectares located along the Mashhad-Neyshabur road, Iran, at a geographical position of 35° to 36° North latitude and 58° to 59° East longitude. Subsequently, the specimens were identified by the Herbarium Department of the Research Center for Plant Sciences at Ferdowsi University of Mashhad, and were registered and confirmed under the herbarium No. 38405.

Rats were housed in standard transparent polycarbonate cages (Razi Rad, Iran) under a controlled ambient temperature of $23-25^\circ\text{C}$, a relative humidity of 35-40%, and a 12-hour light-dark cycle.

The animals were randomly divided into four groups of eight: A healthy control group, a diabetic control group, the first treatment group (treated with an aqueous extract of *Launaea acanthodes* aerial parts (high-performance liquid chromatography [HPLC] $\geq 95\%$) at a dose of 100 mg/kg body weight [BW]), and the second treatment group (treated with the aqueous extract of *Launaea acanthodes* aerial parts (HPLC $\geq 95\%$) at a dose of 300 mg/kg BW).

The healthy control and diabetic control groups received 0.5 mL of saline solution (Samen Pharmaceutical Co., Iran) intraperitoneally every other day for 30 days. Similarly, the two treated diabetic groups received the aqueous extract of *Launaea acanthodes* at doses of 100 and 300 mg/kg BW intraperitoneally every other day over a period of 30 days.

The diabetes model was induced in the diabetic control and diabetic groups treated with 100 and 300 mg/kg BW of the aqueous extract of *Launaea acanthodes* following a 16-hour fasting via an intraperitoneal injection of alloxan monohydrate (Sigma-Aldrich, Germany) at a dose of 120 mg/kg BW, utilizing citrate buffer (pH=5.4) as the alloxan solvent. To ensure the successful diabetes induction, blood samples were collected from the tail vein 72 hours after alloxan injection and experimental diabetes induction. Blood glucose levels were subsequently measured using a glucometer (EasyGluco, Korea). A blood glucose concentration of 250–300 mg/dL was considered the benchmark for successful diabetes induction and was designated as day zero of the experiment.

At the end of the study and following 12 hours of fasting, the occurrence of diabetic nephropathy in the animals was confirmed by evaluating blood biochemical parameters,

including urea, BUN, uric acid, and creatinine. Subsequently, the rats were anesthetized, and following cardiac blood sampling from the left ventricle, the kidney tissue was harvested. The blood samples of the animals were utilized to assay antioxidant enzymes, including SOD, GST, CAT, and MDA.

SOD enzyme activity was measured using Randox kits (Randox, UK) and a biochemistry photometer (Stat Fax 2100, USA). The Bradford method was utilized to determine the protein concentration.

GST enzyme activity was assayed using a ZellBio kit (manufactured in Germany).

CAT enzyme activity was measured based on the decomposition of hydrogen peroxide (H_2O_2) at a wavelength of 240 nm, and the reaction was initiated by adding 30 mM H_2O_2 to an appropriate volume of tissue homogenate in 50 mM sodium phosphate buffer (pH=7). Subsequently, the optical absorbance was monitored over 3 minutes at a wavelength of 240 nm, and the enzymatic activity was calculated as international units per milligram of tissue protein (U/mg tissue protein).

The MDA level was evaluated based on its reaction with thiobarbituric acid (TBA).

Mean comparisons among the experimental groups were performed using one-way analysis of variance (ANOVA), and pairwise comparisons were conducted using Fisher's least significant difference (LSD) post-hoc test at a significance level of less than 0.05.

Results

On the 30th day of the experiment, the fasting blood glucose (FBG) level in the diabetic control group (458 ± 16 mg/dL) significantly increased compared to the healthy control group (86.33 ± 6.33 mg/dL) ($P < 0.008$). Conversely, this level significantly decreased in the diabetic group treated with 100 mg/kg BW (first treatment group, 359.33 ± 21.15 mg/dL) compared to the diabetic control group ($P < 0.011$). This reduction was more pronounced in the diabetic group treated with 300 mg/kg BW (second treatment group, 174 ± 11.08 mg/dL) compared to the diabetic control group ($P < 0.007$). In the comparison between the two treatment groups, the second treatment group showed a significant decrease compared to the first treatment group ($P < 0.037$).

The MDA level in the diabetic control group (9.04 ± 2.38 nmol/mg) significantly increased compared to the healthy control group (2.58 ± 0.70 nmol/mg) ($P < 0.005$). This level showed significant decreases in the first treatment group ($P < 0.014$) and the second treatment group ($P < 0.001$) compared to the healthy control group. In the comparison between the two treatment groups, the second treatment group demonstrated a significant decrease compared to the first treatment group ($P < 0.009$).

SOD enzyme activity in the diabetic control group (0.73 ± 0.22 U/mg) showed a statistically significant decrease compared to the healthy control group (5.61 ± 1.90 U/mg) ($P < 0.001$). However, this activity showed a statistically significant increase in the first treatment group ($P < 0.003$) and the second treatment group ($P < 0.001$) compared to the healthy control group.

GST enzyme activity showed a statistically significant decrease in the diabetic control group (0.40 ± 0.10 U/mg) compared to the healthy control group (3.62 ± 2.44 U/mg) ($P < 0.025$). However, this activity showed a statistically significant increase in the first treatment group ($P < 0.011$) and the second treatment group ($P < 0.001$) compared to the healthy control group.

CAT enzyme activity showed a statistically significant



decrease in the diabetic control group (0.65 ± 0.19 U/mg) compared to the healthy control group (3.91 ± 1.28 U/mg) ($P < 0.017$). Conversely, this activity demonstrated a statistically significant increase in the first treatment group ($P < 0.007$) and the second treatment group ($P < 0.006$) compared to the healthy control group.

The activities of SOD ($P < 0.002$) and CAT ($P < 0.001$) enzymes showed statistically significant increases in the second treatment group compared to the first treatment group; however, no statistically significant difference was observed in GST enzyme activity in the second treatment group compared to the first treatment group.

The mean blood urea level indicated a statistically significant increase in the diabetic control group (18.3 ± 0.8 mg/dL) compared to the healthy control group (28.4 ± 1.5 mg/dL) ($P < 0.001$). In the treated groups, in a dose-dependent manner, the mean blood urea level showed statistically significant reductions in the first treatment group (22.6 ± 1.1 mg/dL, $P < 0.0001$) and the second treatment group (19.9 ± 0.9 mg/dL, $P < 0.0001$) compared to the healthy control group. Additionally, blood urea demonstrated a statistically significant decrease in the second treatment group compared to the first treatment group ($P < 0.032$).

Furthermore, the mean BUN level showed a statistically significant increase in the diabetic control group (8.5 ± 0.3 mg/dL) compared to the healthy control group (13.2 ± 0.7 mg/dL) ($P < 0.0015$). In the treated groups, in a dose-dependent manner, a statistically significant reduction was observed in the mean BUN level in the first treatment group (10.8 ± 0.5 mg/dL, $P < 0.0029$) and the second treatment group (9.4 ± 0.4 mg/dL, $P < 0.0001$) compared to the healthy control group. Moreover, BUN showed a statistically significant decrease in the second treatment group compared to the first treatment group ($P < 0.041$).

In addition, the mean uric acid level demonstrated a statistically significant increase in the diabetic control group (1.1 ± 0.2 mg/dL) compared to the healthy control group (1.9 ± 0.4 mg/dL) ($P < 0.001$). Conversely, in the treated groups, in a dose-dependent manner, the mean uric acid levels indicated statistically significant decreases in the first treatment group (1.5 ± 0.3 mg/dL, $P < 0.0001$) and the second treatment group (1.2 ± 0.2 mg/dL, $P < 0.0001$) compared to the healthy control group. Uric acid levels also showed a statistically significant reduction in the second treatment group compared to the first

treatment group ($P < 0.027$).

The mean creatinine level showed a statistically significant increase in the diabetic control group (0.3 ± 0.05 mg/dL) compared to the healthy control group (0.6 ± 0.1 mg/dL) ($P < 0.0021$). In contrast, in the treated groups, in a dose-dependent manner, the mean creatinine levels showed statistically significant reductions in the first treatment group (0.45 ± 0.08 mg/dL, $P < 0.0033$) and the second treatment group (0.35 ± 0.06 mg/dL, $P < 0.0001$) compared to the healthy control group. Additionally, creatinine levels demonstrated a statistically significant decrease in the second treatment group compared to the first treatment group ($P < 0.039$).

Conclusion

According to the results of this study, administration of the aqueous extract of *Launaea acanthodes* aerial parts at doses of 100 and 300 mg/kg in diabetic models led to the improvement of renal indices involved in diabetes. This effect was mainly achieved through the reduction of LPO and an increase in the activity of antioxidant enzymes. On the other hand, by strengthening the antioxidant defense system and inhibiting oxidative stress, the extract was able to prevent cellular and molecular damages associated with diabetes.

Ethical Statement

This study was approved by the Research Ethics Committees of Payame Noor University (IR.PNU.REC.1403.317).

Funding

This article has been extracted from a research project approved on 14/09/2024 by Payame Noor University and was funded by Payame Noor University (grant No. 48497).

Authors' Contributions

Rahleh Rahbarian (Ph.D): Project administration and design, Project execution, Data collection, Data analysis, Interpretation of the results and Approval of the final manuscript.

Jalal Shegoft: Project execution, Data collection, Data analysis, Interpretation of the results, Drafting of the initial manuscript.

Conflicts of Interest

No conflicts of interest.

Acknowledgement

We would like to thank Payame Noor University, Mashhad Branch, for their cooperation in conducting this study.

The aqueous extract of *Launaea acanthodes* aerial parts, in a dose-dependent manner, can prevent the progression of diabetic nephropathy in alloxan-induced diabetic rats by reducing hyperglycemia, oxidative stress, and renal indices.



تحقیقی

اثر عصاره آبی اندام‌های هوایی گیاه چرخه (*Launaea acanthodes*) بر شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی و کلیوی موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان

دکتر راهله رهباریان^{۱*}، جلال شگفته^۲ ^۱ استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.^۲ دانشجو دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نفروپاتی دیابتی با هیپرگلیسمی مزمن و بروز تغییرات معنی‌دار در شاخص‌های کلیوی شروع می‌شود که این مرحله نقطه عطف بین بروز علائم اولیه نفروپاتی دیابتی و آسیب‌های کلیوی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره آبی اندام‌های هوایی گیاه چرخه (*Launaea acanthodes*) بر شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی و کلیوی موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۳۲ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در چهار گروه هشت تایی شامل گروه شاهد، گروه شاهد دیابتی و دو گروه تحت تیمار با عصاره آبی حاصل از ساقه و برگ گیاه چرخه در غلظت‌های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن قرار گرفتند. مدل دیابت تجربی در گروه‌های شاهد دیابتی و تحت تیمار، پس از ۱۶ ساعت ناشتایی، با یک‌بار تزریق داخل صفاقی آلوکسان مونوهیدرات با دوز ۱۲۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن القاء شد. پس از تأیید دیابت تجربی، پروسه تزریق آلوکسان به مدت ۳۰ روز و به صورت یک روز در میان ادامه پیدا کرد. پس از گذشت ۳۰ روز از پروسه دیابتی نمودن، پروسه تیمار به صورت یک روز در میان و به صورت داخل صفاقی با غلظت‌های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم گیاه چرخه انجام شد. پس از گذشت ۱۲ ساعت از روز سی‌ام، حیوانات بیهوش و پس از خونگیری از بطن چپ قلب، بافت کلیه برداشته شد. پلاسمای خون از نمونه‌های خون جداسازی و نیتروژن اوره خون، اوریک اسید و کراتینین اندازه‌گیری شد. برای تعیین غلظت پروتئین نیز از روش برادفورد استفاده گردید، گلوکاتایون-S-ترانسفراز با استفاده از کیت زل بایو و کاتالاز براساس تجزیه پراکسید هیدروژن مورد سنجش قرار گرفتند. همچنین سوپراکسید دیسموتاز و میزان مالون‌دی‌آلدئید ارزیابی شدند.

یافته‌ها: افزایش معنی‌داری در میزان قندخون ناشتا و مالون‌دی‌آلدئید و کاهش معنی‌داری در آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی شامل سوپراکسید دیسموتاز، گلوکاتایون-S-ترانسفراز و کاتالاز در گروه شاهد دیابتی نسبت به شاهد سالم مشاهده شد ($P < 0/05$). تزریق وابسته به دوز عصاره آبی در غلظت‌های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن منجر به کاهش معنی‌دار قندخون ناشتا و مالون‌دی‌آلدئید و افزایش معنی‌دار آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی شامل سوپراکسید دیسموتاز، گلوکاتایون-S-ترانسفراز و کاتالاز نسبت به شاهد دیابتی بودند ($P < 0/05$). ارزیابی‌های بیوشیمیایی حاکی از افزایش معنی‌دار در گروه شاهد دیابتی نسبت به شاهد سالم در اوره خون، نیتروژن اوره خون، اوریک اسید و کراتینین بود ($P < 0/05$). تزریق وابسته به دوز عصاره در غلظت‌های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن منجر به کاهش معنی‌دار اوره خون، نیتروژن اوره خون، اوریک اسید و کراتینین گردید ($P < 0/05$).

نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد عصاره آبی اندام‌های هوایی گیاه چرخه به‌صورت وابسته به دوز، سبب کاهش هیپرگلیسمی، استرس اکسیداتیو و شاخص‌های کلیوی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: دیابت ملیتوس، استرس اکسیداتیو، آنتی‌اکسیدان‌ها، آزمون‌های عملکرد کلیه، نفروپاتی دیابتی

* نویسنده مسؤول: دکتر راهله رهباریان، پست الکترونیکی: a_rahbarian@pnu.ac.ir

نشانی: مشهد، دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، تلفن: ۰۵۱-۳۸۶۸۳۹۰۰

وصول	۱۴۰۴/۳/۲۷	اصلاح نهایی	۱۴۰۴/۸/۱۱	پذیرش	۱۴۰۴/۸/۱۲	انتشار	۱۴۰۵/۴/۲۴
------	-----------	-------------	-----------	-------	-----------	--------	-----------

مقدمه

در نهایت به پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش سطوح معنی‌دار مالون‌دی‌آلدئید (MDA) منجر می‌گردد.^۱ در این میان، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ذاتی نظیر سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوکاتایون-S-ترانسفراز (GST) در برابر این طوفان

دیابت شیرین به عنوان اختلال متابولیک و مزمن، با ایجاد هیپرگلیسمی ناشتا ($FBS > 126 \text{ mg/dl}$)، طوفانی از گونه‌های فعال اکسیژن (Reactive Oxygen Species: ROS) را به راه می‌اندازد که

چرخه در شروع مرحله گل‌دهی در نیمه اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ از حد فاصل جاده مشهد به نیشابور در موقعیت جغرافیایی ۳۵ تا ۳۶ درجه طول شمالی و ۵۸ تا ۵۹ درجه عرض شمالی به مساحت حدود ۷ هکتار جمع‌آوری شد. حداقل و حداکثر ارتفاع مناطق به ترتیب ۱۲۵۸ و ۱۴۸۲ متر از سطح دریا است. سپس نمونه‌ها توسط بخش هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد مورد شناسایی و با هرباریوم ۳۸۴۰۵ ثبت و مورد تایید قرار گرفت. پس از طی مراحل خشک شدن در سایه در دمای 36 ± 3 درجه سانتی‌گراد، توسط آسیاب خرد شد. برای تهیه عصاره، ۵۰ گرم از پودر خشک‌شده برگ گیاه چرخه داخل بالن دستگاه سوکسله ریخته شد و به آن ۴۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر به عنوان حلال به آن اضافه گردید. آب مقطر توسط گرم‌کن دستگاه به جوش آمده و در نهایت عصاره جداسازی گردید. مبرد دستگاه وظیفه سرد نمودن بخارات اضافی را دارد که منجر به آهسته نمودن کاهش حجم محلول می‌شود. در نهایت، پس از گذشت تقریبی ۱۰ ساعت، مایع نسبتاً غلیظی در ته بالن جمع شد. سپس با حذف حلال در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد عصاره تام استخراج گردید. پس از حذف حلال، عصاره با غلظت‌های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن تهیه و با نرمال سالین به‌عنوان حلال دارو، ترکیب و سپس با عبور از فیلتر ۰/۲ میکرومتر استریل و سپس به گروه‌های دیابتی تزریق گردید. انتخاب دوزهای ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم از عصاره گیاه چرخه براساس شواهد علمی معتبر و پروتکل‌های تثبیت‌شده در مطالعات اخیر صورت گرفته است.^{۱۲، ۸}

حیوانات مورد استفاده و شرایط نگهداری: پروتکل کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی رعایت گردید. موش‌های صحرایی در قفس‌های استاندارد پلی‌کربنات شفاف (رازی راد، ایران) با دمای محیطی ۲۳-۲۵ درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی ۴۰-۳۵ درصد و دوره روشنایی-تاریکی ۱۲ ساعته نگهداری شدند. در طول مدت آزمایش، حیوانات با آب به مقدار کافی توسط بطری‌های پلاستیکی ۵۰۰ میلی‌لیتری و غذای فشرده مخصوص موش با فرمول استاندارد (دانه‌داران توس، ایران) تغذیه شدند. به‌منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی ناشی از استرس و اضطراب حاصل از عدم سازش با محیط جدید، آزمایش پیش رو با گذشت حداقل ۱۰ روز بعد از استقرار حیوانات در محیط جدید آغاز گردید.^{۱۳}

حیوانات به‌صورت تصادفی در چهار گروه هشت تایی به شرح زیر تقسیم شدند.^۸

گروه اول: شاهد سالم.

گروه دوم: شاهد دیابتی.

گروه تیمار اول: دیابتی تحت تیمار با عصاره آبی حاصل از اندام هوایی گیاه چرخه ($HPLC \geq 95\%$) با غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم بر

تضعیف می‌گردند.^۲ این تغییرات نه تنها متابولیسم را مختل می‌کنند؛ بلکه به اندام‌های حیاتی به‌ویژه کلیه‌ها، آسیب رسانده و با افزایش شاخص‌هایی نظیر نیتروژن اوره خون، اوره خون، کراتینین و اسید اوریک، به نفروپاتی دیابتی منجر می‌شوند. دیابت تنها به کلیه‌ها محدود نشده؛ بلکه عوارض سیستمیک آن از قلب تا مغز را در برمی‌گیرد.^۳ برای شناسایی این عوارض، روش‌های تشخیصی سنتی همانند تست تحمل گلوکز (Oral Glucose Tolerance Test: OGTT) و هموگلوبین A1c (درصد $HbA1c \geq 6/5$) همچنان پرکاربردند. این در حالی است که حسگرهای زیستی نوین مانند نانو بیوسنسورهای الکتروشیمیایی با دقت ۹۵ درصد^۴ و حسگرهای پوشیدنی که گلوکز را از طریق عرق ترشحاتی مورد ارزیابی قرار می‌دهند؛ تشخیص دیابت را متحول کرده‌اند.^۵ این ابزارهای هرچند پیشرفته هنوز با چالش‌هایی مانند هزینه و پایداری مواجه هستند که درمان‌های مکمل را ضروری می‌نماید. در خط اول این درمان‌ها، عصاره‌های گیاهی همچون گزنه و رزماری به دلیل خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد دیابتی، دریچه جدیدی از امید را در مدیریت دیابت ایجاد کرده‌اند. این گیاهان، در مطالعات پیش‌بالینی اثرات محافظتی خود را از هیپوگلیسمی تا تقویت دفاع آنتی‌اکسیدانی نشان داده‌اند.^{۶، ۷} در این میان، عصاره گیاه چرخه (*Launaea acanthodes*) گیاهی بومی با سابقه‌ای طولانی در طب سنتی خاورمیانه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه که در درمان دیابت و التهاب کاربرد دارد؛ به دلیل کمبود مطالعات آزمایشگاهی جامع در مدل‌های حیوانی دیابت، به‌ویژه دیابت ایجاد شده با آلوکسان مونویدرات، در سایه‌ها پنهان مانده است.^۸

عصاره‌های گیاهی قادرند از طریق کاهش هیپوگلیسمی پیشرفت عوارض مرتبط با دیابت را کند نمایند؛^۹ اما داده‌های پیش‌بالینی برای گیاه چرخه به‌ویژه در مورد اثراتش بر قند خون، استرس اکسیداتیو (MDA، SOD، CAT، GST) و عملکرد کلیوی (نیتروژن اوره خون، اوره خون، کراتینین و اوریک اسید)، بسیار محدود است.^{۱۱، ۱۰} این شکاف تحقیقاتی، فرصتی بی‌نظیر برای کشف پتانسیل درمانی این گیاه را فراهم می‌کند؛ به‌ویژه در مدل‌های حیوانی که می‌توانند مکانیسم‌های حفاظتی را روشن کنند. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره آبی اندام‌های هوایی گیاه چرخه بر شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی و کلیوی موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه تجربی روی ۳۲ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با محدوده سنی ۱۵-۱۴ هفته و محدوده وزنی 16 ± 148 گرم در آزمایشگاه تحقیقات جانوری گروه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد انجام شد.

روش جمع‌آوری و تهیه عصاره: اندام هوایی (ساقه و برگ) گیاه

کیلوگرم وزن بدن.

گروه تیمار دوم: تحت تیمار با عصاره آبی حاصل از اندام هوایی گیاه چرخه (۹۵ درصد $\geq$ HPLC) با غلظت ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن.

گروه‌های شاهد سالم و شاهد دیابتی در طی ۳۰ روز و به صورت یک روز در میان، به روش داخل صفاقی، ۰/۵ میلی‌لیتر محلول سالین (شرکت داروسازی ثامن، ایران) را دریافت کردند. این عمل به منظور یکسان نمودن شوک حاصل از تزریق انجام گرفت. همچنین، دو گروه دیابتی تحت تیمار نیز در عرض ۳۰ روز و به صورت یک روز در میان و به روش داخل صفاقی عصاره آبی گیاه چرخه با غلظت‌های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن را دریافت نمودند.

روش القاء دیابت تجربی: مدل دیابت در گروه‌های شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمار با غلظت‌های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن عصاره آبی گیاه چرخه، پس از ۱۶ ساعت ناشتایی و با تزریق داخل صفاقی آلوکسان مونوهیدرات (سیگما-آلدريج، آلمان) به میزان ۱۲۰ میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن^{۱۴} و با استفاده از بافر سترات (pH=۵/۴) به عنوان حلال آلوکسان، القاء گردید. برای اطمینان از دیابتی شدن نمونه‌ها، ۷۲ ساعت پس از تزریق آلوکسان و القاء دیابت تجربی، برای تایید دیابت، از ورید دمی خونگیری به عمل آمد و قندخون توسط دستگاه گلوکومتر (ایزی گلوکو، کره) اندازه‌گیری شد. قند خون ۳۰۰-۲۵۰ میلی‌گرم/دسی‌لیتر به عنوان شاخص دیابتی شدن و روز صفر آزمایش در نظر گرفته شد.^۸

معیارهای ورود و خروج نمونه‌های مورد مطالعه: نمونه‌های مورد آزمایش با گذشت حدود ۳۰ روز پس از تزریق آلوکسان، برای دیابتی شدن، از نظر معیارهای ورود و خروج در آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه‌های دیابتی که معیار مطالعه را داشتند به آزمایش وارد شدند و نمونه‌هایی که قندخون آنها به دیابتی شدن نرسیده بود؛ نمونه‌های دارای قند خون بالای ۳۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر به دلیل پرخاشگری و کوری و مرگ خودبخودی نمونه‌ها از مطالعه خارج شدند.

سنجش‌های بیوشیمیایی: در پایان این مطالعه و به دنبال ۱۲ ساعت ناشتایی، با ارزیابی یکسری پارامترهای بیوشیمیایی خون (اوره، نیترژن اوره خون، اسید اوریک و کراتینین) از بروز نفروپاتی دیابت در حیوانات اطمینان حاصل پیدا کرده؛ سپس موش‌های صحرایی بیهوش و پس از خونگیری قلبی از بطن چپ، بافت کلیه از بدن خارج گردید. نمونه‌های خون بدون ماده ضدانعقاد به درون انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۲ دقیقه قرار داده شد. پس از انعقاد نمونه‌های خون، نمونه‌ها در سانتریفیوژ با ۵۰۰۰ دور به مدت ۱۲ دقیقه قرار داده شدند. پس از طی مدت ۱۲ دقیقه، پلاسما خون

توسط پیپت از روی بخش لخته خون برداشته شد و به لوله آزمایش دیگری منتقل گردید. لوله‌ها از نظر سنجش آزمایش‌های بیوشیمیایی نیترژن اوره خون (BUN)، اوره، اسید اوریک و کراتینین (Cr) جداسازی و به آزمایشگاه تشخیص طبی منتقل گردید. سپس، بافت کلیه خارج شده، پس از شستشو با محلول سالین به همراه بافر تریس به مدت ۲ دقیقه با دستگاه هموژنایزر (التراتوراکس T25 دیجیتال، آلمان) با ۵۰۰۰ دور در دقیقه هموژنیزه شد. محلول هموژنیزه شده، سانتریفیوژ (هرمل Z366، آلمان) گردید. برای جلوگیری از تخریب آنزیم‌ها و پروتئین‌ها، تمامی مراحل در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد (سانتریفیوژ یخچال‌دار) انجام و از محلول ۰/۵ میلی‌مولار فنیل متیل سولفونیل فلوراید (سیگما-آلدريج، آلمان) به عنوان مهارکننده پروتئازها استفاده شد. پس از انجام سانتریفیوژ، محلول رویی شفاف از بقیه محلول جدا گردید، بخش زیرین رسوب کرده دور ریخته شد و از محلول شفاف رویی برای سنجش آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز، گلوکاتایون S-ترانسفراز، کاتالاز و مالون‌دی‌آلدئید استفاده گردید.

فعالیت سوپراکسیددیسموتاز با استفاده از کیت‌های شرکت راندوکس (راندوکس، انگلستان) و با کمک دستگاه فتومتر بیوشیمی (Stat Fax 2100، آمریکا) اندازه‌گیری شد. برای تعیین غلظت پروتئین از روش برادفورد استفاده گردید. برای این منظور ۲ میلی‌لیتر از محلول برادفورد به ۴۰ میکرولیتر از محلول هموژنیزه بافتی اضافه شده و به مدت ۵ دقیقه در دما آزمایشگاه انکوبه شد. سپس در طول موج ۵۹۵ نانومتر و در مقابل معرف بلانک، جذب آن بررسی گردید. با انطباق درصد مهار روی منحنی استاندارد، فعالیت آنزیم به دست آمد و فعالیت آن برحسب واحد بین‌الملل در میلی‌گرم پروتئین بافت (U/mg tissue protein) گزارش گردید.^۶

فعالیت آنزیم گلوکاتایون S-ترانسفراز، با استفاده از کیت زل بایو (ساخت آلمان) سنجش گردید. به طوری که در این واکنش کاهش جذب نوری در طول موج ۳۴۰ نانومتر اندازه‌گیری و جذب به دست آمده در پروتکل قید شده در دستورالعمل کیت، ضرب گردید و میزان فعالیت آنزیم برحسب واحد بین‌الملل در میلی‌گرم پروتئین بافتی (U/mg tissue protein) گزارش شد.^{۱۵}

فعالیت آنزیم کاتالاز، بر اساس تجزیه پراکسید هیدروژن (H_2O_2) در طول موج ۲۴۰ نانومتر اندازه‌گیری و واکنش با اضافه کردن ۳۰ میلی‌مولار پراکسید هیدروژن به حجم مناسبی از هموژن بافتی در بافر فسفات سدیم ۵۰ میلی‌مولار (pH=۷) انجام شد. سپس جذب نوری طی ۳ دقیقه در طول موج ۲۴۰ نانومتر بررسی و فعالیت آنزیمی برحسب واحد بین‌الملل در میلی‌گرم پروتئین بافتی (U/mg tissue protein) محاسبه شد.^{۱۶}

میزان مالون‌دی‌آلدئید براساس واکنش آن با تیوباریتوریک اسید

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار مالون دی آلدئید، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوکاتینون اس ترانسفراز بافت کلیه موش‌های صحرایی به تفکیک گروه‌های مورد مطالعه

متغیرها	شاهد سالم	شاهد دیابتی	تیمار اول دیابتی (دریافت کننده عصاره آبی اندام هوایی گیاه چرخه با غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)	تیمار دوم دیابتی (دریافت کننده عصاره آبی اندام هوایی گیاه چرخه با غلظت ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)
مالون دی آلدئید (nmol/mg)	۲/۵۸±۰/۷۰	۹/۰۴±۲/۳۸	۵/۱۳±۱/۴	۳/۹۰±۰/۸
سوپراکسید دیسموتاز (U/mg)	۵/۶۱±۱/۹۰	۰/۷۳±۰/۲۲	۱/۷۲±۰/۳۵	۲/۶۵±۰/۷۱
کاتالاز (U/mg)	۳/۹۱±۱/۲۸	۰/۶۵±۰/۱۹	۱/۴۲±۰/۲۶	۲/۱۴±۰/۸۸
گلوکاتینون -s- ترانسفراز (U/mg)	۳/۶۲±۲/۴۴	۰/۴۰±۰/۱۰	۱/۲۷±۰/۳۷	۱/۵۹±۰/۳۱

جدول ۲: مقایسه دو به دو مقادیر Error bar و LSD، p-value سطح قندخون ناشتا، مالون دی آلدئید، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوکاتینون اس ترانسفراز بافت کلیه در موش‌های صحرایی

متغیرها	گروه شاهد دیابتی در مقایسه با گروه شاهد سالم	گروه تیمار اول در مقایسه با گروه شاهد دیابتی	گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه شاهد دیابتی	LSD	Error basn (SD برای هر گروه)
قندخون ناشتا (mg/dl)	<۰/۰۰۱ *	۰/۰۲۱ *	۰/۰۷۰ *	۰/۰۳۷ *	۱۰/۲۴
مالون دی آلدئید (nmol/mg)	<۰/۰۰۱ *	۰/۰۱۴ *	<۰/۰۰۱ *	۰/۰۰۹ *	۰/۱۵۴
سوپراکسید دیسموتاز (U/mg)	<۰/۰۰۱ *	۰/۰۰۳ *	<۰/۰۰۱ *	۰/۰۰۲ *	۱/۰۲۴
کاتالاز (U/mg)	<۰/۰۰۱ *	۰/۰۰۷ *	۰/۰۰۶ *	۰/۰۰۱ *	۱/۲۸
گلوکاتینون -s- ترانسفراز (U/mg)	<۰/۰۰۱ *	۰/۰۱۱ *	<۰/۰۰۱ *	۰/۰۹۸	۰/۵۱۲

گروه‌های تیمار اول و دوم دیابتی به ترتیب دریافت کننده عصاره آبی اندام هوایی گیاه چرخه با غلظت ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن.

P<۰/۰۵ *

یافته‌ها


میزان قندخون ناشتا در گروه شاهد دیابتی (۴۵۸±۱۶ mg/dl) در مقایسه با گروه شاهد سالم (۸۶/۳۳±۶/۳۳ mg/dl) در روز سی‌ام آزمایش به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (P<۰/۰۰۸) و این میزان در گروه دیابتی تحت تیمار با ۱۰۰ میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن (گروه تیمار اول، ۳۵۹/۳۳±۲۱/۱۵ mg/dl) در مقایسه با گروه شاهد سالم به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (P<۰/۰۱۱) و این کاهش در گروه دیابتی تحت تیمار با ۳۰۰ میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن (گروه تیمار دوم، ۱۷۴±۱۱/۰۸ mg/dl) در مقایسه با گروه شاهد سالم از معنی‌داری بیشتری برخوردار بود (P<۰/۰۰۷). در مقایسه بین دو گروه تیمار، گروه تیمار دوم نسبت به گروه تیمار اول کاهش معنی‌داری داشت (P<۰/۰۳۷).

میزان مالون دی آلدئید در گروه شاهد دیابتی (۹/۰۴±۲/۳۸ nmol/mg) در مقایسه با گروه شاهد سالم (۲/۵۸±۰/۷۰ nmol/mg) به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (P<۰/۰۰۵). این میزان در گروه تیمار اول (۰/۷۳±۰/۲۲ U/mg) و گروه تیمار دوم (۰/۷۳±۰/۲۲ U/mg) در مقایسه با گروه شاهد سالم کاهش معنی‌داری نشان داد. در مقایسه بین دو گروه تیمار، گروه تیمار دوم نسبت به گروه تیمار اول کاهش معنی‌داری داشت (P<۰/۰۰۹) (جدول یک).


فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در گروه شاهد دیابتی (۰/۷۳±۰/۲۲ U/mg) در مقابل گروه شاهد سالم

در محلولی با دما ۹۰ درجه سانتی‌گراد با pH=۲-۳، به مدت ۱۵ دقیقه صورت گرفت. در اثر واکنش مربوطه در محلول موردنظر، رنگ صورتی ایجاد شد که این محلول به مدت ۱۰ دقیقه در ۳۰۰ دور سانتریفیوژ گردید. سپس جذب نوری آن در طول موج ۵۳۲ نانومتر در مقابل معرف بلانک توسط دستگاه اسپکتروفومتر (Aqualytic AL800، آلمان) مورد بررسی قرار گرفت. منحنی استاندارد بر اساس رقت‌های تترا اتوکسی پروپان تهیه و جذب‌های نوری به‌دست آمده با منحنی استاندارد تطبیق داده شد. سپس، نتایج به‌صورت نانو مول در میلی گرم پروتئین بافتی (nmol/mg tissue protein) گزارش شد.^{۱۷}


آنالیز آماری: داده‌های به‌دست آمده توسط نرم‌افزار آماری GraphPad Prism-10 تحلیل شدند. داده‌ها با توجه به حجم پایین نمونه و کمی بودن نتایج به‌دست آمده، توسط آزمون شاپیرو-ویلک و براساس طبیعی یا غیر طبیعی بودن توزیع فراوانی داده‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. برای مقایسه میانگین بین گروه‌های مورد آزمایش از آنالیز واریانس یک‌طرفه و برای مقایسه زوج گروه‌ها از آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنی‌دار فیشر استفاده شد. نتایج به‌دست آمده به همراه محاسبات آماری مربوطه به‌صورت انحراف معیار و میانگین گزارش شد. سطح معنی‌داری همه آزمون‌ها کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.




نمودار ۳: میانگین و انحراف معیار سطح اسیداوریک خون موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در گروه‌های مورد مطالعه
 * $P < 0.001$ گروه شاهد دیابتی در مقایسه با شاهد سالم
 φ $P < 0.0001$ تیمار اول و تیمار دوم در مقایسه با شاهد سالم
 ** $P < 0.002$ گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول
 گروه‌های تیمار اول و دوم دیابتی به ترتیب دریافت کننده عصاره آبی اندام هوایی گیاه چرخه با غلظت ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن.



نمودار ۱: میانگین و انحراف معیار سطح اوره خون موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در گروه‌های مورد مطالعه
 * $P < 0.001$ گروه شاهد دیابتی در مقایسه با شاهد سالم
 φ $P < 0.0001$ تیمار اول و تیمار دوم در مقایسه با شاهد سالم
 ** $P < 0.002$ گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول
 گروه‌های تیمار اول و دوم دیابتی به ترتیب دریافت کننده عصاره آبی اندام هوایی گیاه چرخه با غلظت ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن.



نمودار ۴: میانگین و انحراف معیار سطح کراتینین خون موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در گروه‌های مورد مطالعه
 * $P < 0.001$ گروه شاهد دیابتی در مقایسه با شاهد سالم
 φ $P < 0.0001$ تیمار اول و تیمار دوم در مقایسه با شاهد سالم
 ** $P < 0.002$ گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول
 گروه‌های تیمار اول و دوم دیابتی به ترتیب دریافت کننده عصاره آبی اندام هوایی گیاه چرخه با غلظت ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن.



نمودار ۲: میانگین و انحراف معیار سطح نیترژن اوره خون موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در گروه‌های مورد مطالعه
 * $P < 0.0015$ گروه شاهد دیابتی در مقایسه با شاهد سالم
 φ $P < 0.0001$ تیمار اول و تیمار دوم در مقایسه با شاهد سالم
 ** $P < 0.0041$ گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول
 گروه‌های تیمار اول و دوم دیابتی به ترتیب دریافت کننده عصاره آبی اندام هوایی گیاه چرخه با غلظت ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن.

اول ($P < 0.007$) و گروه تیمار دوم ($P < 0.006$) در مقایسه با گروه شاهد سالم افزایش آماری معنی‌داری یافت (جدول یک).

فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ($P < 0.002$) و کاتالاز ($P < 0.001$) در گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول افزایش آماری معنی‌داری یافت؛ اما فعالیت آنزیم گلوکوتایون-S-ترانسفراز در گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد (جدول یک).

میانگین اوره خون در گروه شاهد دیابتی (18.3 ± 0.8 mg/dl) در مقایسه با گروه شاهد سالم (28.4 ± 1.5 mg/dl) افزایش آماری معنی‌داری یافت ($P < 0.001$) (نمودار یک). میانگین اوره خون در گروه‌های تحت تیمار به صورت وابسته به دوز در گروه تیمار اول (22.6 ± 1.1 mg/dl) و گروه تیمار دوم (19.9 ± 0.9 mg/dl) در مقایسه با گروه شاهد سالم ($P < 0.0001$)

(5.61 ± 1.90 U/mg) کاهش آماری معنی‌داری یافت ($P < 0.001$). فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در گروه تیمار اول ($P < 0.003$) و گروه تیمار دوم ($P < 0.001$) در مقابل شاهد سالم افزایش آماری معنی‌داری یافت (جدول یک).

فعالیت آنزیم گلوکوتایون-S-ترانسفراز در گروه شاهد دیابتی (0.40 ± 0.10 U/mg) در مقایسه با گروه شاهد سالم (3.62 ± 2.44 U/mg) کاهش آماری معنی‌داری یافت ($P < 0.025$). فعالیت آنزیم گلوکوتایون-S-ترانسفراز در گروه تیمار اول ($P < 0.011$) و گروه تیمار دوم ($P < 0.001$) در مقایسه با گروه شاهد سالم افزایش آماری معنی‌داری یافت (جدول یک).

فعالیت آنزیم کاتالاز در گروه شاهد دیابتی (0.65 ± 0.19 U/mg) در مقایسه با گروه شاهد سالم (3.91 ± 1.28 U/mg) کاهش آماری معنی‌داری یافت ($P < 0.017$). فعالیت آنزیم کاتالاز در گروه تیمار

آلوکسان علاوه بر القاء دیابت، موجب بروز تغییرات اولیه و معنی‌دار در شاخص‌های کلیوی درگیر در دیابت از طریق کاهش آنزیم‌های آنتی اکسیدانی ذاتی و ایجاد استرس اکسیداتیو، بین گروه‌های شاهد سالم و دیابتی می‌شود. دیابت مزمن در شرایط هیپرگلیسمی پایدار، موجب تولید بیش از حد رادیکال‌های آزاد به ویژه گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و ایجاد استرس اکسیداتیو می‌شود. این پدیده با کاهش سیالیت غشایی، افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و مالون‌دی‌آلدئید در بافت‌های حیاتی به‌ویژه کلیه همراه است و یکی از مکانیسم‌های اساسی در بروز عوارض ناشی از دیابت به شمار می‌رود.^{۱۳} یافته‌های مطالعه حاضر نیز در راستای این گزارش‌ها قرار دارد و نقش مهم اختلالات اکسیداتیو در پاتوژنز دیابت را تأیید می‌کند.

استفاده از گیاهان دارویی و غنی از ترکیبات پلی‌فنولی به‌ویژه فلاونوئیدها، به‌عنوان راهبردی برای کاهش استرس اکسیداتیو و محافظت بافتی مورد توجه پژوهشگران و متخصصین تغذیه قرار گرفته است. فلاونوئیدها به دلیل داشتن حلقه‌های فنولیک قادر به حذف مستقیم رادیکال‌های آزاد هستند که علاوه بر آن، با مهار آنزیم‌های تولیدکننده گونه‌های فعال اکسیژن نظیر NADPH oxidase و افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ذاتی شامل SOD، CAT و GST به بهبود تعادل سیستم ردوکس کمک می‌کنند.^{۱۷،۱۶} همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که این ترکیبات با فعال‌سازی مسیرهای سیگنالینگ PI3K/Akt و AMPK، موجب افزایش حساسیت به انسولین و بهبود عملکرد ناقل گلوکز-۲ در بافت‌های محیطی می‌شوند.^{۱۸}

مطالعات مختلفی بر روی گیاه چرخه، چه با عصاره‌های هیدروالکلی و چه با عصاره آبی، نتایج مشابهی را گزارش کرده‌اند. این یافته‌ها شامل کاهش قندخون، افزایش انسولین سرمی، کاهش سطح MDA و افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بوده‌اند.^{۱۳و۱۴} در برخی پژوهش‌ها علاوه بر نتایج بیوشیمیایی، شواهد هیستولوژیک نیز ارائه شده که نشان‌دهنده بهبود ساختار جزایر لانگرهانس، کاهش نکروز سلول‌های بتا و کاهش آسیب گلوامروولی کلیه بوده است.^{۱۲} هرچند مطالعه حاضر فاقد داده‌های هیستولوژیک است؛ اما همخوانی نتایج بیوشیمیایی آن با چنین مطالعاتی نشان می‌دهد که اثرات محافظتی این گیاه احتمالاً در سطح بافتی نیز قابل انتظار باشد.

مقایسه گیاه چرخه با سایر گیاهان غنی از فلاونوئید دیدگاه روشن‌تری را فراهم می‌سازد. در مورد چای سبز (*Camellia sinensis*) گزارش شده که EGCG (Epigallocatechin gallate) به‌عنوان فلاونوئید اصلی با کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش فعالیت SOD و CAT و همچنین

کاهش آماری معنی‌داری یافت (نمودار یک). همچنین اوره خون در گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول کاهش آماری معنی‌داری نشان داد ($P < 0.032$ ، نمودار یک).

میانگین نیتروژن اوره خون در گروه شاهد دیابتی (8.5 ± 0.3 mg/dl) در مقایسه با گروه شاهد سالم (13.2 ± 0.7 mg/dl) افزایش آماری معنی‌داری یافت ($P < 0.0015$) (نمودار ۲). میانگین نیتروژن اوره خون در گروه‌های تحت تیمار به‌صورت وابسته به دوز در گروه تیمار اول (10.8 ± 0.5 mg/dl، $P < 0.0029$) و گروه تیمار دوم (9.4 ± 0.4 mg/dl، $P < 0.0001$) در مقایسه با گروه شاهد سالم کاهش آماری معنی‌داری یافت (نمودار ۲). همچنین نیتروژن اوره خون در گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول کاهش آماری معنی‌داری نشان داد ($P < 0.041$ ، نمودار ۲).

میانگین اسیداوریک در گروه شاهد دیابتی (1.1 ± 0.2 mg/dl) در مقابل شاهد سالم (1.9 ± 0.4 mg/dl) افزایش آماری معنی‌داری یافت ($P < 0.001$) (نمودار ۳). میانگین اسیداوریک در گروه‌های تحت تیمار به‌صورت وابسته به دوز در گروه تیمار اول (1.5 ± 0.3 mg/dl، $P < 0.0001$) و گروه تیمار دوم (1.2 ± 0.2 mg/dl، $P < 0.0001$) در مقایسه با گروه شاهد سالم کاهش آماری معنی‌داری یافت (نمودار ۳). همچنین اسیداوریک در گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول کاهش آماری معنی‌داری نشان داد ($P < 0.027$ ، نمودار ۳).

میانگین کراتینین در گروه شاهد دیابتی (0.3 ± 0.05 mg/dl) در مقابل شاهد سالم (0.6 ± 0.1 mg/dl) افزایش آماری معنی‌داری یافت ($P < 0.0021$) (نمودار ۴). میانگین کراتینین در گروه‌های تحت تیمار به‌صورت وابسته به دوز در گروه تیمار اول (0.45 ± 0.08 mg/dl، $P < 0.0033$) و گروه تیمار دوم (0.35 ± 0.06 mg/dl، $P < 0.0001$) در مقایسه با گروه شاهد سالم کاهش آماری معنی‌داری یافت (نمودار ۴). همچنین کراتینین در گروه تیمار دوم در مقایسه با گروه تیمار اول کاهش آماری معنی‌داری نشان داد ($P < 0.039$ ، نمودار ۴). مقایسه دو به دو در شاخص‌های مورد مطالعه در جدول ۲ آمده است.

بحث

با توجه به نتایج این مطالعه، تجویز عصاره آبی اندام‌های هوایی گیاه چرخه در دوزهای ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم در مدل‌های دیابتی، منجر به بهبود شاخص‌های کلیوی درگیر در دیابت گردید. این اثر به‌طور عمده از طریق کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی حاصل شد. از سوی دیگر، این عصاره با تقویت سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و مهار استرس اکسیداتیو، توانست از آسیب‌های سلولی و مولکولی مرتبط با دیابت جلوگیری نماید.

بهبود ساختاری بافت پانکراس، از آسیب سلول‌های بتا جلوگیری می‌کند.^{۱۹} در زردچوبه (*Curcuma longa*)، کورکومین علاوه بر خواص آنتی‌اکسیدانی قوی، اثرات ضدالتهابی و ضد فیبروتیک نیز دارد و مطالعات هیستولوژیک نشان داده‌اند که مصرف آن موجب کاهش نفوذ سلول‌های التهابی در بافت کلیه و کاهش فیروز گلوامرولی می‌شود.^{۲۰} در جینسینگ (*Panax ginseng*)، جینسنوزیدها علاوه بر افزایش سطح انسولین و کاهش سطح سرمی گلوکز، تغییرات بافتی مثبتی شامل کاهش مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌های بتا و بازسازی نسبی جزایر لانگرهانس را نشان داده‌اند.^{۲۱} این شباهت‌ها بیانگر آن است که گیاه چرخه احتمالاً از طریق مسیرهای مشابه، یعنی کاهش استرس اکسیداتیو، تعدیل پاسخ‌های التهابی و بهبود عملکرد پانکراس و کلیه عمل می‌کند.

اثر عصاره گیاه چرخه را می‌توان در چهار مرحله شامل: الف) کاهش استرس اکسیداتیو از طریق حذف ROS و افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی؛ ب) اثر محافظتی بر روی پانکراس (شامل افزایش ترشح انسولین، کاهش مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی و بهبود بیان ژن‌های اساسی نظیر GLUT-2 و PDX-1)؛^{۲۲} ج) اثر محافظتی کلیوی (کاهش دفع آلبومین ادراری، مهار پراکسیداسیون لیپیدی و تعدیل فرآیندهای التهابی و فیبروتیک) و د) بهبود متابولیسم گلوکز در بافت‌های محیطی از طریق فعال‌سازی مسیر AMPK و افزایش حساسیت به انسولین خلاصه نمود. این مجموعه مکانیسم‌ها به‌طور همبستگی مثبت در کاهش قندخون و جلوگیری از پیشرفت عوارض ناشی از دیابت نقش دارند.^{۲۳}

با وجود این شواهد، برخی محدودیت‌ها نظیر: الف) بررسی مسیرهای مولکولی دقیق در محافظت کلیوی نظیر NF- κ B، Nrf2 و TGF- β و همچنین بررسی و شناسایی ترکیبات فعال خاص در اثرات مشاهده شده؛ ب) اطمینان قطعی از عملکرد عصاره در مطالعات انسانی؛ ج) عدم گزارشات جامع در اثرات بلند مدت و عوارض احتمالی عصاره بر اندام‌های مختلف؛ د) ناهمگونی در روش استخراج (آبی در مقابل هیدروالکلی، دوز ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) و مسیر تجویز (خوراکی یا تزریقی) سبب شده مقایسه مستقیم نتایج دشوار باشد. اکثر پژوهش‌ها صرفاً بر شاخص‌های اکسیداتیو تمرکز داشته و بررسی جامع شاخص‌های التهابی و فیبروتیک کمتر انجام شده است. در حالی که این عوامل نقش مهمی در پیشرفت عوارض ناشی از دیابت دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرند. در نهایت، یافته‌های مطالعه حاضر در مورد اثرات عصاره آبی اندام‌های هوایی گیاه چرخه با شواهد موجود از عصاره هیدروالکلی و همچنین با داده‌های هیستولوژیک مطالعات دیگر همخوانی دارد. همچنین مقایسه با دیگر گیاهان غنی از فلاونوئید نیز نشان داد که این

گیاه در همان قاعده کلی عمل می‌کند و اثرات ضد دیابتی خود را از طریق کاهش استرس اکسیداتیو، بهبود عملکرد سلول‌های بتا و محافظت کلیوی اعمال می‌نماید. از آنجایی که استرس اکسیداتیو و کاهش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی از مهم‌ترین مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیک در بروز و پیشرفت نفروپاتی دیابتی محسوب می‌شوند؛ لذا عصاره آبی گیاه چرخه با تعدیل این مسیرها، پتانسیل بالایی برای جلوگیری از پیشرفت دیابت به مرحله نفروپاتی دیابتی دارد. بنابراین، استفاده از این عصاره به‌عنوان مکمل آنتی‌اکسیدانی در کنار داروهای ضد دیابت می‌تواند راهکاری مؤثر در کاهش و پیشگیری از عوارض کلیوی ناشی از دیابت باشد.

طراحی مطالعاتی برای تعیین اثر عصاره بر بیان ژن‌ها و پروتئین‌های کلیدی درگیر در استرس اکسیداتیو، التهاب و فیروز کلیوی و انجام مطالعات بالینی کنترل شده و بررسی‌های دقیق‌تر هیستولوژیک برای اثبات قطعی مکانیسم‌های یادشده و تعیین دوز و فرمولاسیون مناسب در جهت ورود عصاره در انسان ضروری است.

نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره آبی اندام‌های هوایی گیاه چرخه به‌صورت وابسته به دوز، با کاهش هیپرگلیسمی، استرس اکسیداتیو و شاخص‌های کلیوی، می‌تواند از پیشرفت نفروپاتی دیابتی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان جلوگیری کند.

ملاحظات اخلاقی

مطالعه مورد تایید کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه پیام نور (IR.PNU.REC.1403.317) قرار گرفت.

حمایت مالی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ دانشگاه پیام نور بود و مورد حمایت مالی (شماره ۴۸۴۹۷) دانشگاه پیام نور قرار گرفت.

مشارکت نویسندگان

دکتر راهله رهباریان: مدیریت و طراحی پروژه، انجام پروژه، جمع‌آوری داده‌ها، آنالیز داده‌ها، تفسیر نتایج و تایید نسخه نهایی مقاله.

جلال شگفته: انجام پروژه، جمع‌آوری داده‌ها، آنالیز داده‌ها، تفسیر نتایج و نوشتن نسخه اولیه مقاله.

تعارض منافع

بین نویسندگان مقاله تعارض منافع وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله مراتب تشکر قدردانی خود را از دانشگاه پیام نور واحد مشهد برای همکاری در انجام این مطالعه اعلام می‌داریم.

References

- Shrivastav D, Mishra J, Sharma VK, Singh S, Khan MI, Alsanie SA, et al. Biochemical and Physiological Response During Oxidative Stress: A Cross-Species Perspective. *Rejuvenation Res.* 2026 Feb;29(1):29-39. <https://doi.org/10.1177/15491684251386712>.
- Ghasemi-Dehnoo M, Amini-Khoei H, Lorigooini Z, Rafieian-Kopaei M. Oxidative stress and antioxidants in diabetes mellitus. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.* 2020 Oct;13(10):431-38. <https://doi.org/10.4103/1995-7645.291036>.
- Romagnani P, Agarwal R, Chan JCN, Levin A, Kalyesubula R, Karam S, et al. Chronic kidney disease. *Nat Rev Dis Primers.* 2025 Jan;11(1):9. <https://doi.org/10.1038/s41572-025-00597-3>.
- Liu M, Song Y, Liu M, Deng D, Zhang W, Wang T, et al. The Application of Functional Nanomaterials-Based Electrochemical Biosensors in Detecting Cancer Biomarkers: A Review. *Molecules.* 2025 Jun;30(13):2708. <https://doi.org/10.3390/molecules30132708>.
- Akter A, Apu MMH, Veeranki YR, Baroud TN, Posada-Quintero HF. Recent Studies on Smart Textile-Based Wearable Sweat Sensors for Medical Monitoring: A Systematic Review. *Journal of Sensor and Actuator Networks.* 2024;13(4):40. <https://doi.org/10.3390/jsan13040040>.
- Gbadamosi IT, Adeyi AO, Oyekanmi OO, Somade OT. *Launaea taraxacifolia* leaf partitions ameliorate alloxan-induced pathophysiological complications via antioxidant mechanisms in diabetic rats. *Metabol Open.* 2020 Feb;6:100029. <https://doi.org/10.1016/j.metop.2020.100029>.
- Ghasemzadeh Rahbardar M, Hosseinzadeh H. Therapeutic effects of rosemary (*Rosmarinus officinalis* L.) and its active constituents on nervous system disorders. *Iran J Basic Med Sci.* 2020 Sep;23(9):1100-12. <https://doi.org/10.22038/ijbms.2020.45269.10541>.
- Rahbarian R, shegofta J. [Antioxidant effects of *Launaea acanthodes* (Boiss.) Kuntze plant on hormonal changes of testosterone in diabetic rats]. *Feyz Med Sci J.* 2025;29(1):12-22. <http://dx.doi.org/10.48307/FMSJ.2025.29.1.2>. [Article in Persian]
- Sekhon-Loodu S, Rupasinghe HPV. Evaluation of Antioxidant, Antidiabetic and Antiobesity Potential of Selected Traditional Medicinal Plants. *Front Nutr.* 2019 Apr;6:53. <https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00053>.
- Putra IMWA, Fakhrudin N, Nurrochmad A, Wahyuono S. A Review of Medicinal Plants with Renoprotective Activity in Diabetic Nephropathy Animal Models. *Life (Basel).* 2023 Feb;13(2):560. <https://doi.org/10.3390/life13020560>.
- Mahmoud VL, Shayesteh R, Foong Yun Loh TK, Chan SW, Sethi G, Burgess K, et al. Comprehensive review of opportunities and challenges of ethnomedicinal plants for managing type 2 diabetes. *Heliyon.* 2024 Oct;10(23):e39699. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39699>.
- Marvibaigi M, Hosseini SM, Amini N. *Launaea acanthodes* (Boiss) O. Kuntze mediates hepatic glucose metabolism and ameliorates impaired pancreatic function in streptozotocin-induced diabetic rats. *J Ethnopharmacol.* 2021 Mar; 268:113577. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113577>.
- Rahbarian R. [Studing the effect of hydroalcoholic extract of *Avicennia marina* leaves on antioxidant and renal indices in alloxan-induced diabetic rats]. *Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences.* 2024;12(3):77-90. <http://dx.doi.org/10.61186/jmsthums.12.3.27>. [Article in Persian]
- Fajarwati I, Solihin DD, Wresdiyati T, Batubara I. Self-recovery in diabetic Sprague Dawley rats induced by intraperitoneal alloxan and streptozotocin. *Heliyon.* 2023 Apr;9(5):e15533. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15533>.
- Flecknell P. Laboratory animal anaesthesia. 4th ed. London: Academic press. 2015.
- Hong Y, Boiti A, Vallone D, Foulkes NS. Reactive Oxygen Species Signaling and Oxidative Stress: Transcriptional Regulation and Evolution. *Antioxidants (Basel).* 2024 Mar;13(3):312. <https://doi.org/10.3390/antiox13030312>.
- Trivedi R. The Role of Flavonoids in Mitigating Oxidative Stress: Mechanisms, Applications and Therapeutic Potential. *Asian Journal of Pharmaceutics.* 2025 Mar;19(1):125. <https://doi.org/10.22377/ajp.v19i01.6072>.
- Sefren Geiner T, Ari H, Hirofumi D, Dikdik K. A Comprehensive Review of Free Radicals, Oxidative Stress, and Antioxidants: Overview, Clinical Applications, Global Perspectives, Future Directions, and Mechanisms of Antioxidant Activity of Flavonoid Compounds. *Journal of Chemistry.* 2024; 5594386. <https://doi.org/10.1155/2024/5594386>.
- Murdiono WE, Syafiqah Salman NA, Ab Razak NA, Effendy Halmi MI, Hong Yong JW, Jalil AMM, et al. Effects of leaf ages, altitude and clone types on nutrient elements and antioxidant activity of tea (*Camellia sinensis* L. (O) Kuntze) in tropical conditions. *Applied Food Research.* 2025 Dec;5(2):101110. <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.101110>.
- Rosyid Ridho MA, Indriani RD. The The Potential of *Curcuma longa* as an Antidiabetic Agent: Review: The Potential of *Curcuma longa* as an Antidiabetic Agent: Review. *Journal of Medicine and Health Technology.* 2025;2(1). <https://doi.org/10.12962/j30466865.v2i1.2383>.
- Han LH, Jin M, Qi X, Nan Z, Cui C. Ginseng flower total saponin extract alleviates type 1 diabetes mellitus-associated liver injury via PI3K/AKT/HIF-1 α signaling pathway. *Journal of Agriculture and Food Research.* 2025 Oct; 23:102198. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2025.102198>.
- El-Fadaly AA, Younis IY, Abdelhameed MF, Ahmed YH, Ragab TIM, El Gendy AEG, et al. Protective Action Mechanisms of *Launaea mucronata* Extract and Its Nano-Formulation against Nephrotoxicity in Rats as Revealed via Biochemical, Histopathological, and UPLC-QTOF-MS/MS Analyses. *Metabolites.* 2023 Jun;13(7):786. <https://doi.org/10.3390/metabo13070786>.